



Návrh na Cenu předsednictva ČLS JEP, z.s. za vědecké práce

- ☐ monografie / učební text (včetně elektronických vydání)
☒ původní vědecká nebo souborná publikace v odborném časopisu

Návrh za OS;SL:	ČOS ČLS JEP
Autor/Autoři:	Buchler T, Ambrozova M, Majek O, Dianova T, Klika P, Dusek L.
Název publikace:	Risk of second primary malignancies after adjuvant chemotherapy for colon cancer.
Vyšlo: (nakladatelství, časopis)	Cancer. 2025 Oct 15;131(20):e70116. doi: 10.1002/cncr.70116. PMID: 41060089; PMCID: PMC12506602.
ISBN/ISSN:	Online ISSN:1097-0142 Print ISSN:0008-543X

Přiložte 1 originál publikace (u monografie), pdf soubor (u článku).

Zdůvodnění:

Karcinom tlustého střeva patří mezi nejčastější onkologická onemocnění v České republice i ve světě. Díky pokrokům v adjuvantní chemoterapii přežívá stále více pacientů s onemocněním ve stadiu II a III. Tím ovšem vyvstává naléhavá otázka, kterou se tato studie přímo zabývá: jaký dlouhodobý dopad má samotná léčba na riziko vzniku nových nádorů? Studie přináší velmi rozsáhlou populační analýzu. Zahrnuje přes 18 000 pacientů léčených v letech 2010–2022, což dává výsledkům vysokou statistickou sílu a reprezentativitu. Klíčovým zjištěním je, že adjuvantní chemoterapie na bázi oxaliplatin je spojena s výrazně vyšším rizikem vzniku druhého primárního nádoru – zejména druhého kolorektálního karcinomu. Standardizovaný poměr incidence (SIR) dosahoval hodnoty 2,2 pro druhý kolorektální nádor u pacientů léčených oxaliplatinou, zatímco u pacientů bez chemoterapie nebo léčených pouze fluorouracilem/kapecitabinem byl významně nižší. Desetileté kumulativní riziko vzniku druhého nádoru dosáhlo v oxaliplatinové skupině 14,6 % oproti 11,0 % ve skupině bez chemoterapie. Tato zjištění mají přímý klinický dopad. Poukazují na nutnost individualizovaného sledování

Vyplněný formulář zašlete do 31. 5. 2026 na adresu: Sekretariát ČLS JEP, z.s., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

tel.: 224 26 62 23, e-mail: czma@cls.cz

přeživších pacientů – tzv. survivorship care – s důrazem na intenzivnější kolonoskopické kontroly u těch, kteří podstoupili léčbu oxaliplatinou. Studie tak zpochybňuje stávající jednotné sledovací protokoly a otevírá diskusi o tom, zda by riziko sekundárních malignit mělo vstupovat do rozhodování o volbě adjuvantního režimu, zejména u pacientů s nižším rizikem relapsu. Z vědeckého hlediska je studie cenná také proto, že vychází z národního onkologického registru, tedy ze skutečných klinických dat, ne z teoretického modelování. To zvyšuje přenositelnost závěrů do každodenní praxe a staví českou onkologii do středu mezinárodní odborné diskuse.

19.5.2026

Schválil výbor organizační složky na zasedání dne:

Za správnost odpovídá:

Prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Vědecký sekretář ČOS ČLS JEP

.....
podpis pověřené osoby OS;SL